

Fiche d'information sur les médicaments

létrozole (lé-tro-zo-le)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Femara^{MD}

Présentation: Comprimé

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement d'un certain type de cancer du sein sensible aux hormones, ou d'autres cancers.

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

Dites à votre équipe de soins de santé si vous avez ou avez eu des troubles de santé importants, en particulier :

- Des problèmes hépatiques, rénaux ou cardiaques,
- Une tension artérielle élevée hors de contrôle,
- Des niveaux de cholestérol élevés,
- Des douleurs musculaires ou articulaires,
- Une perte osseuse (affinement des os) ou des fractures (ou si des membres de votre famille présentent ou ont présenté ces symptômes),
- Des allergies.

Les comprimés de létrozole peuvent contenir une petite quantité de lactose. Si vous êtes intolérant au lactose, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

Comment ce médicament affecte-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Communiquez avec votre équipe de soins de santé sur les sujets suivants :

- La façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- La façon dont ce médicament pourrait influencer sur votre fertilité (capacité à concevoir un enfant), si cela s'applique à vous.
- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser **deux méthodes efficaces de contraception** simultanément pendant au moins **20 jours** après votre dernière dose (si vous êtes une femme), et **6 mois** après votre dernière dose (si vous êtes un homme). Demandez à votre équipe de soins de santé quelle est la méthode de contraception la plus adaptée à votre situation.
- N'allaitiez pas pendant ce traitement.
- Ce médicament peut être nocif pour le fœtus. Parlez à votre équipe de soins de santé si vous êtes enceinte, si vous tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est généralement pris par voie orale une fois par jour. Demandez à votre équipe de soins de santé comment et quand vous devez prendre votre médicament.
- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau au cours ou en dehors des repas.
- N'écrasez pas et ne mastiquez pas les comprimés.
- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en rappelez. Si vous remarquez cet oubli peu de temps avant l'heure de la dose suivante (par exemple environ 2 ou 3 heures avant l'heure prévue), sautez la dose oubliée et prenez la dose suivante à l'heure prévue. N'augmentez pas la dose pour compenser pour la dose oubliée.
- Si vous vomissez après avoir pris votre médicament, communiquez avec votre équipe de soins de santé.
- Si vous prenez une dose trop élevée de votre médicament par erreur, ou si pensez que votre enfant un votre animal de compagnie pourrait l'avoir avalé, il est impératif que vous appelez immédiatement le Centre antipoison de l'Ontario au numéro suivant : 1-800-268-9017.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou d'autres produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments ou des produits de santé naturels. Les interactions pourraient faire échouer le traitement et causer des effets secondaires graves.
- Informez votre équipe de soins si vous prenez :
 - ◊ Des médicaments sur ordonnance ou en vente libre, ou toute autre drogue, de la marijuana par exemple (à titre médical ou récréatif),
 - ◊ Des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
- Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter de prendre un de ces traitements.
- Ne prenez aucun médicament contenant des œstrogènes (y compris des compléments à base d'herbes) pendant votre traitement au létrozole : en effet, cela pourrait limiter l'efficacité de votre traitement.

À FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- CONSULTEZ votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, opérer, de recevoir des soins dentaires ou avant toute autre intervention médicale.
- PARLEZ à votre équipe de soins de santé de votre risque de développer de l'ostéoporose et des troubles cardiaques à la suite de ce traitement.

À NE PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS d'alcool pendant votre traitement sans en parler à votre équipe de soins de santé auparavant. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- NE CONDUISEZ PAS, n'utilisez pas de machine et n'effectuez aucune tâche qui exige que vous soyez alerte si vous vous sentez fatigué, étourdi ou somnolent (moins courant).

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Ne jetez pas les médicaments non utilisés à votre domicile. Ramenez-les à la pharmacie pour qu'ils soient éliminés de manière sécuritaire.
- Conservez ce médicament à température ambiante, dans son emballage d'origine dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière. Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.

Comment manipuler en toute sécurité les médicaments oraux contre le cancer?

Si vous êtes un patient :

- Lavez-vous les mains avant de toucher votre médicament oral contre le cancer et après.
- Avalez chaque comprimé en entier. Ne l'écrasez pas et ne le mâchez pas.

Si vous êtes un aidant :

- Lavez-vous les mains avant de toucher votre médicament oral contre le cancer et après.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou bien s'il est possible que vous-même ou votre partenaire tombiez enceinte :

- Portez des gants en nitrile ou en latex lorsque vous manipulez les comprimés, les capsules ou les liquides.
- Lavez-vous les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés, même si votre peau n'a pas été en contact avec le médicament oral contre le cancer.
- Jetez vos gants après chaque utilisation. Ne réutilisez pas les gants.

Que faire en cas de contact d'un médicament oral contre le cancer avec les yeux ou avec la peau?

En cas de contact du médicament avec votre peau :

- Lavez votre peau avec une grande quantité de savon et d'eau.
- Si votre peau devient rouge ou irritée, parlez-en à votre équipe de soins de santé.

Si le médicament entre en contact avec vos yeux :

- Rincez vos yeux à l'eau courante immédiatement. Laissez couler l'eau pendant au moins 15 minutes en gardant les yeux ouverts.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez observer lorsque vous prenez du létrozole. Ils sont présentés du plus courant au moins courant. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres qui ne sont pas indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes prêter attention et quand demander de l'aide. Consultez ce tableau si vous observez tout secondaire lorsque vous prenez du létrozole.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Modifications de vos niveaux hormonaux</p> <p>Votre traitement entraîne des modifications des niveaux d'œstrogènes dans votre organisme. Cela peut affecter votre humeur, vos niveaux d'énergie et votre apparence physique, entre autres.</p> <p>Vous pourriez présenter plusieurs de ces symptômes ou aucun. Vos symptômes pourraient aussi changer au fil de votre traitement.</p> <p>Signes à surveiller :</p> <p>Bouffées de chaleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une bouffée de chaleur est une sensation soudaine de chaleur dans le haut du corps et le visage. Elles peuvent apparaître rapidement et sans signe précurseur. • Le visage peut rougir, et la transpiration peut s'intensifier. • Les bouffées de chaleur peuvent rendre le sommeil difficile. <p>Autres symptômes de niveaux d'œstrogènes bas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécheresse vaginale (potentiellement accompagnée de pertes blanches ou de saignements) • Pertes de mémoire • Sautes d'humeur, dépression • Amincissement des os et accroissement des risques de fractures 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires les plus courants (au moins 50 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Pour contribuer à prévenir les bouffées de chaleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évitez les éléments déclencheurs tels que les aliments épicés, l'alcool et la caféine (thé, café et boissons sucrées). • Pratiquez une activité physique régulière. Demandez à votre équipe de soins de santé quels types d'exercices physiques conviennent à votre situation avant de commencer un nouveau type d'activité. • Il peut aussi être utile d'arrêter de fumer. <p>En cas de bouffées de chaleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour vous rafraîchir, portez des vêtements légers en coton, ou des couches faciles à enlever. Utilisez un ventilateur. • Buvez beaucoup d'eau ou d'autres liquides (au moins 6 ou 8 tasses), sauf indication contraire de votre équipe de soins de santé. • Placez une serviette sur vos draps avant de vous coucher, de manière à pouvoir la changer facilement si vous transpirez pendant la nuit. <p>Il est possible que les bouffées de chaleur s'atténuent avec le temps. Parlez à votre équipe de soins de santé si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, ou si un niveau d'oestrogènes vous dérange.</p>	

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Fatigue</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensation de fatigue ou manque d'énergie qui dure longtemps et ne s'atténue pas avec le repos ou le sommeil. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021 Page 6 of 13

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soyez actif. Essayez de pratiquer 30 minutes d'activité physique modérée (vous devez réussir à parler confortablement pendant l'exercice) presque tous les jours. • Parlez à votre équipe de soins de santé avant de commencer une nouvelle activité physique. • Allez à votre rythme, ne vous pressez pas. Repoussez les activités moins importantes. Reposez-vous quand vous en ressentez le besoin. • Demandez à vos proches de vous aider avec les tâches ménagères, le magasinage, ou de s'occuper des enfants et des animaux de compagnie. • Mangez bien et buvez au moins 6 à 8 verres d'eau ou d'autres liquides chaque jour (sauf si votre équipe de soins de santé vous a demandé de boire plus ou moins). • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous êtes fatigué. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la fatigue pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Maux de tête, douleurs articulaires, musculaires ou crampes légères</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un léger mal de tête, • De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) conformément à la prescription. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche), qui peut aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la douleur pour de plus amples renseignements.</p>	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires courants (25 à 49 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Légère enflure</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez constater une légère enflure ou bouffissure au niveau des bras ou des jambes. Dans de rares cas, elles peuvent être graves. <p>Que faire?</p> <p>Pour éviter les enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Privilégiez une alimentation faible en sel. <p>En cas d'enflures :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portez des vêtements amples. • Pour les jambes et pieds enflés, élevez vos pieds quand vous êtes assis. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Niveaux de cholestérol ou de lipides dans le sang supérieurs à la normale</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Généralement, des niveaux de cholestérol ou de lipides ne déclenchent aucun symptôme. • Comme votre traitement peut entraîner un niveau de cholestérol élevé, votre équipe de soins de santé peut décider d'effectuer des analyses sanguines régulières pour contrôler votre taux de cholestérol. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.
mars 2021

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre équipe de soins de santé peut vous prescrire des médicaments pour traiter des niveaux de cholestérol ou de lipides élevés. • Si vous suivez déjà un traitement pour des niveaux de cholestérol ou de lipides élevés, votre équipe de soins de santé peut modifier la dose ou le type de médicament prescrit. 	
<p>Étourdissement</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez vous sentir étourdi ou sur le point de vous évanouir. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allongez-vous pour éviter de tomber. • Levez-vous et commencez à bouger doucement une fois que vous vous sentez mieux. • Évitez de conduire ou d'utiliser des machines si vous vous sentez étourdi. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Constipation</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selles moins fréquentes qu'à l'accoutumée. • Selles dures et petites comme des granules. • Nécessité de pousser fort et de faire un effort pour expulser des selles. • Maux ou crampes d'estomac. • Ventre ballonné, sensation de ventre plein ou inconfort. • Fuites de selles liquides. • Érucations et flatulences importantes. • Nausée ou vomissements. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si les symptômes sont intenses ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Que faire?</p> <p>Prévention de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mangez plus d'aliments riches en fibres comme des fruits à peau, des légumes-feuilles et des céréales entières. • Buvez au moins 6 à 8 tasses de liquide par jour, sauf si votre équipe de soins de santé vous a conseillé d'en boire plus ou moins. • Soyez actif. Une activité physique peut vous aider à aller régulièrement à la selle. • Si vous prenez des médicaments opioïdes contre la douleur, demandez à votre équipe de soins de santé si vous pouvez manger plus de fibres. <p>Traitement de la constipation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous n'êtes pas allé à la selle depuis 2 à 3 jours, vous aurez peut-être besoin de prendre un laxatif (médicament qui vous aidera à aller à la selle). Demandez à votre équipe de soins de santé ce que vous devez faire. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la constipation pour de plus amples renseignements.</p>	
<p>Nausée et vomissements</p> <p>(Symptômes généralement légers)</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La nausée est la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pouvez également ressentir des étourdissements. • Vous pourriez avoir la nausée dans les heures ou les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour éviter la nausée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter. 	<p>Parlez à votre équipe de soins de santé si la nausée persiste au-delà de 48 heures, ou bien si les vomissements sont violents ou durent plus de 24 heures.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<ul style="list-style-type: none"> • Buvez des liquides clairs et faites de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Ne mangez pas d'aliments épicés, frits, ou ayant une odeur forte. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausées ou de vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments antinauséux (au besoin) conformément à la prescription. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure sur la nausée et les vomissements pour de plus amples renseignements. • Parlez à votre équipe de soins de santé si : <ul style="list-style-type: none"> ◦ La nausée persiste au-delà de 48 heures, ◦ Les vomissements sont intenses ou persistent au-delà de 24 heures. 	
<p>Douleurs osseuses, perte osseuse et fractures osseuses</p> <p>Votre traitement pourrait rendre vos os plus fins qu'à l'accoutumée. Les os fins sont faibles et fragiles. Des mouvements simples ou des chutes mineures pourraient entraîner des fractures. Votre équipe de soins de santé peut contrôler la densité de vos os (mesurer leur solidité) par scintigraphie osseuse.</p> <p>Signes à surveiller :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pourriez ressentir une douleur osseuse aiguë ou inhabituelle, en particulier dans votre dos ou au niveau de vos hanches et de vos poignets. <p>Que faire?</p> <p>Pour prévenir les fractures et les pertes osseuses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que votre équipe de soins de santé vous demande de modifier votre alimentation ou de prendre des compléments de calcium ou de vitamine D, ou d'autres médicaments sur prescription. Consultez votre équipe de soins de santé avant de prendre l'un de ces produits. 	<p>Consultez votre équipe de soins de santé avant de prendre quelque supplément que ce soit. Obtenez une aide médicale d'urgence si vous ressentez une douleur osseuse aiguë ou si vous êtes dans l'incapacité de bouger.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Obtenez une aide médicale d'urgence si vous ressentez des douleurs osseuses aiguës, ou si vous êtes dans l'incapacité de bouger : il pourrait s'agir de symptômes de fracture.</p> <p>Consultez notre brochure sur la santé des os pendant un traitement contre le cancer pour en savoir davantage.</p>	

D'autres effets secondaires rares mais graves sont possibles.

Si vous constatez N'IMPORTE LEQUEL des symptômes suivants, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de cancérologie ou recevoir immédiatement des soins médicaux d'urgence :

- Douleur, gonflement ou durcissement d'une veine de votre bras ou jambe,
- Apparition soudaine d'une toux, respiration difficile, douleur à la poitrine ou toux sanglante,
- Difficulté à voir, à parler ou à bouger les bras et les jambes,
- Éruption cutanée grave (la peau peut peler ou présenter des ampoules), visage, langue ou lèvres enflés, poitrine ou gorge serrée,
- Vue trouble, floue ou sombre, ou difficulté à voir la nuit,
- Arythmie cardiaque, douleurs dans la poitrine ou évanouissements, enflure des jambes, des chevilles ou du ventre, essoufflement.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés
: _____

Autres remarques :

March 2021 Updated/Revised info sheet

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.