

Fiche d'information sur les médicaments

lanréotide

 (lan-RÉ-o-tide)

Ce document fournit des renseignements généraux à propos de votre médicament. Il ne remplace pas les conseils de votre équipe de spécialistes des soins de santé. Vous devez toujours discuter de votre traitement avec votre spécialiste des soins de santé et consulter la notice d'accompagnement du produit pour plus de détails.

Autre nom(s): Somatuline^{MD} Autogel^{MD}

Présentation: Seringue préremplie

Pourquoi ce médicament est-il utilisé?

- Pour le traitement des tumeurs neuroendocrines ou du syndrome carcinoïde

Qu'est-ce que je dois faire avant d'avoir ce médicament?

- Indiquez à votre équipe de soins de santé si vous avez présentement ou si vous avez déjà eu des problèmes médicaux importants, en particulier les suivants :
 - ◊ problèmes au niveau du cœur, du foie ou des reins,
 - ◊ problèmes de thyroïde,
 - ◊ problèmes de vésicule biliaire,
 - ◊ diabète, ou
 - ◊ toute allergie.

N'oubliez pas de :

- Parler à votre équipe de soins de santé de tous les autres médicaments que vous prenez.
- Continuer à prendre les autres médicaments qui vous ont été prescrits, sauf indication contraire de la part de votre équipe de soins de santé.

Comment ce médicament affecte-t-il les relations sexuelles, la grossesse et l'allaitement?

Discutez avec votre équipe de soins de santé des sujets suivants :

- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre santé sexuelle.
- Comment ce médicament pourrait influencer sur votre capacité à concevoir un enfant, si cela s'applique à vous.

Ce traitement peut être nocif pour le fœtus. Parlez-en à votre équipe de soins de santé si vous (ou votre partenaire) êtes enceinte, tombez enceinte pendant le traitement, ou si vous allaitez.

- S'il y a **le moindre** risque de grossesse, vous et votre partenaire devez utiliser simultanément **2 formes efficaces de contraception** pendant au moins **6 mois** après votre dernière dose de traitement (recommandation générale). Renseignez-vous auprès de votre équipe de soins de santé pour connaître les meilleures solutions contraceptives pour vous.
- N'allaitez pas pendant que vous prenez ce médicament.

Comment ce médicament est-il donné?

- Ce médicament est administré par injection sous la peau.
- Il est généralement administré toutes les 4 semaines. Discutez avec votre équipe de soins de santé de votre calendrier de traitement.
- Si vous (ou votre aidant) faites l'injection, votre équipe de soins de santé vous montrera (ou montrera à votre aidant) comment procéder. Parlez à votre infirmière ou à votre pharmacien pour en savoir plus.
- Vous pouvez sortir le médicament du réfrigérateur environ 30 minutes avant de l'utiliser afin que l'injection soit plus agréable.
- Si vous avez manqué votre rendez-vous de traitement, demandez à votre équipe de soins de santé ce qu'il faut faire.
- Si vous prenez une trop grande quantité de votre médicament par accident, ou si vous pensez qu'un enfant ou un animal domestique a avalé votre médicament, vous devez appeler immédiatement le Centre antipoison de l'Ontario au : 1-800-268-9017.

Qu'est-ce que je dois savoir de plus lorsque je prends ce médicament?

Ce médicament interagira-t-il avec d'autres médicaments ou des produits de santé naturels?

- Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, des vitamines, des aliments et des produits de santé naturels. Les interactions peuvent rendre le traitement moins efficace ou causer des effets secondaires graves.
- Informez votre équipe de soins de santé si vous prenez :
 - des médicaments sur ordonnance ou en vente libre (sans ordonnance) et toute autre drogue, comme le cannabis/marijuana (à des fins médicales ou récréatives),
 - des produits naturels comme des vitamines, des tisanes, des médicaments homéopathiques et d'autres suppléments.
- Consultez votre équipe de soins de santé avant de commencer ou d'arrêter l'un d'entre eux.

À FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- **CONSULTEZ** votre équipe de soins de santé avant de vous faire vacciner, de subir une opération, de recevoir des soins dentaires ou de procéder à toute autre intervention médicale.
- **VÉRIFIEZ** régulièrement votre glycémie si vous prenez des médicaments contre le diabète. Ce traitement peut engendrer des variations de votre taux de sucre dans le sang.

À NE PAS FAIRE pendant que vous prenez ce médicament :

- **NE FUMEZ PAS ET NE BUVEZ PAS D'ALCOOL** pendant votre traitement sans en parler d'abord à votre équipe de soins de santé. Le tabac et l'alcool peuvent aggraver les effets secondaires et réduire l'efficacité de votre traitement.
- **NE CONDUISEZ PAS, N'UTILISEZ PAS de machinerie et N'EFFECTUEZ AUCUNE** tâche qui nécessite d'être attentif et vigilant si vous vous sentez étourdi.

Comment dois-je conserver ce médicament de façon sécuritaire?

- Conservez le médicament au réfrigérateur, mais ne le congelez pas. Tenez le médicament hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Les protège-aiguilles, les aiguilles et les seringues utilisés ne doivent jamais être réutilisés et doivent toujours être jetés dans un contenant antiperforation ou un contenant pour objets pointus et tranchants qui vous a été remis par votre pharmacien.
- Demandez à votre pharmacien de vous aider à jeter correctement ces articles, y compris le contenant rempli.
- Ne jetez pas les médicaments non utilisés à la maison. Apportez-les à votre pharmacie pour qu'ils soient jetés en toute sécurité.

Quels sont les effets secondaires de ce médicament?

Le tableau suivant énumère les effets secondaires que vous pouvez ressentir lorsque vous recevez du lanréotide. Ce tableau énumère les effets secondaires, des plus courants aux moins courants. Il est peu probable que vous observiez tous les effets secondaires énumérés, et vous pourriez en constater d'autres non indiqués.

Lisez l'ensemble du tableau des effets secondaires pour savoir à quels symptômes il faut prêter attention et quand obtenir de l'aide. Consultez ce tableau si vous rencontrez des effets secondaires pendant que vous prenez du lanréotide.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Douleurs ou crampes dans le ventre</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Douleurs ou crampes dans votre ventre. • La constipation et la diarrhée peuvent causer des douleurs dans votre ventre. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la douleur est sévère, qu'elle s'aggrave ou qu'elle ne disparaît pas, parlez à votre équipe de soins de santé des autres causes possibles. 	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Nausées et vomissements</p> <p>(Ces symptômes sont généralement légers)</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les nausées sont la sensation d'avoir envie de vomir. Vous pouvez également vous sentir étourdi. • Vous pourriez avoir des nausées dans les heures ou les jours suivant votre traitement. <p>Que faire?</p> <p>Pour éviter les nausées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il est plus facile de prévenir les nausées que de les traiter. • Si l'on vous a donné des médicaments contre la nausée, prenez-les selon l'ordonnance, même si vous n'avez pas envie de vomir. • Buvez des liquides clairs et mangez de petits repas. Respirez de l'air frais et reposez-vous. • Évitez les aliments épicés et frits, ou les aliments ayant une forte odeur. • Limitez votre consommation de caféine (café, thé) et évitez l'alcool. <p>En cas de nausées ou vomissements :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez vos médicaments contre les nausées de secours (au besoin), selon l'ordonnance. • Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure Nausées et vomissements pour en savoir davantage. • Communiquez avec votre équipe de soins de santé dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Des nausées pendant plus de 48 heures. ◦ Des vomissements graves ou pendant plus de 24 heures. 	<p>Si les nausées persistent pendant plus de 48 heures ou si les vomissements persistent pendant plus de 24 heures, communiquez avec votre équipe de soins de santé.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Maux de tête légers, douleurs articulaires, musculaires ou crampes</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête légers • De nouvelles douleurs musculaires ou articulaires, des crampes musculaires, ou des courbatures <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenez des antalgiques (acétaminophène ou opioïdes comme la codéine, la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone) selon ce qui vous est prescrit. • Reposez-vous souvent et essayez de pratiquer une activité physique légère (comme la marche), car cela pourrait vous aider. <p>Demandez à votre équipe de soins de santé de vous fournir la brochure Douleur pour en savoir davantage.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>
<p>Problèmes de vésicule biliaire</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vous pouvez avoir des nausées, des vomissements ou un jaunissement de la peau ou des yeux, une douleur intense et une sensibilité dans la partie supérieure droite du ventre. • La douleur peut s'étendre à l'épaule droite ou au dos. <p>Que faire?</p> <p>Si vous présentez l'un de ces signes et symptômes, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>	<p>Obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence.</p>

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Effets secondaires moins courants (10 à 24 personnes sur 100)	
Effet secondaire et mesure à prendre	Quand communiquer avec l'équipe de soins de santé
<p>Hypertension artérielle</p> <p>Signes à surveiller</p> <ul style="list-style-type: none"> • En général, il n'y a pas de signes d'hypertension artérielle. • Dans de rares cas, vous pouvez avoir des maux de tête, un essoufflement ou des saignements de nez. <p>Que faire?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez régulièrement votre tension artérielle. • Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. <p>Si vous avez un mal de tête intense, obtenez immédiatement une aide médicale d'urgence, car il peut s'agir d'un signe d'une tension artérielle trop élevée.</p>	<p>Parlez-en à votre équipe de soins de santé si ces symptômes sont graves ou ne s'améliorent pas.</p>

D'autres effets secondaires rares, mais graves, sont possibles.

Si vous présentez l'UN des symptômes suivants, vous devez en parler à votre fournisseur de soins de santé en cancérologie ou obtenir immédiatement une aide médicale d'urgence :

- Rougeur, démangeaisons, ecchymoses, éruption cutanée et/ou gonflement au point d'injection.
- Signes d'allergie, tels que : démangeaisons, éruption cutanée, gonflement des lèvres, du visage ou de la langue, serrement de la poitrine et de la gorge.
- Signes d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, tels que : soit intense, besoin d'uriner plus souvent que d'habitude, sensation de faim, faiblesse, étourdissements ou confusion.
- Faible rythme cardiaque ou évanouissements.
- Diarrhée sévère, selles de couleur argileuse ou urine anormalement foncée.
- Douleur au centre du ventre pouvant s'étendre au dos.
- Difficulté à digérer les aliments, selles huileuses et malodorantes.
- Perte de poids inhabituelle.
- Problèmes d'audition, bourdonnements dans les oreilles.
- Sentiment de fatigue ou de faiblesse plus important que d'habitude, essoufflement.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.

Qui joindre si j'ai des questions ou besoin d'aide?

Mon fournisseur de soins de santé de cancérologie est : _____

Pendant la journée, je dois joindre : _____

En soirée, fin de semaine et durant les jours fériés : _____

Autres remarques :

June 2024 New information sheet (Nouvelle fiche d'information)

Les renseignements présentés dans les fiches d'information sur les médicaments, les fiches d'information sur les régimes et les renseignements à l'intention des patients pour le traitement des symptômes figurant dans le Formulaire pharmaceutique (le "Formulaire") ne sont offerts aux spécialistes de la santé et aux patients qu'à des fins d'information. Ces données ne visent pas à couvrir l'ensemble des utilisations, instructions, précautions, interactions médicamenteuses ou effets secondaires d'un médicament en particulier, et ne doivent pas servir à indiquer qu'une utilisation particulière d'un médicament est sans danger, approprié ou efficace pour un trouble de santé donné.

Les patients doivent toujours consulter un fournisseur de soins de santé s'ils ont des questions touchant l'information présentée dans le Formulaire. L'information du Formulaire ne vise pas à fournir ou remplacer une consultation médicale et ne doit pas servir à cette fin. L'utilisation du Formulaire doit être assujettie à une opinion clinique et les régimes prescrits peuvent ne pas concorder avec l'information du Formulaire.

Vous pouvez consulter la version la plus récente de cette fiche à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/drugs>

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le traitement des symptômes à la page <https://www.cancercareontario.ca/fr/symptomes>

Ressources créées par l'équipe chargée du formulaire des médicaments de CCO, avec l'avis de l'équipe de formation des patients et des conseillers des patients et des familles.